

アスベリン®錠10・20
アスベリン®散10%
アスベリン®ドライシロップ®2%
アスベリン®シロップ®0.5%
アスベリン®シロップ「調剤用」2%



用法・用量 注意喚起カード

●剤形の違いによる処方誤り、調剤誤りにご注意ください。

用法・用量

通常成人には、チペピジンヒベンズ酸塩として1日66.5～132.9mg(チペピジンクエン酸塩60～120mg相当量)を3回に分割経口投与する。

小児には、チペピジンヒベンズ酸塩として1日1歳未満5.54～22.1mg(同5～20mg相当量)、1歳以上3歳未満11.1～27.7mg(同10～25mg相当量)、3歳以上6歳未満16.6～44.3mg(同15～40mg相当量)を3回に分割経口投与する。
 なお、年齢・症状により適宜増減する。

(1日量剤形換算)

剤形	1歳未満	1歳以上 3歳未満	3歳以上 6歳未満	成人
錠10	—	—	—	6～12錠
錠20	—	—	—	3～6錠
散10%	0.05～0.2g	0.1～0.25g	0.15～0.4g	0.6～1.2g
ドライシロップ 2%	0.25～1g	0.5～1.25g	0.75～2g	3～6g
シロップ 0.5%	1～4mL	2～5mL	3～8mL	12～24mL
シロップ 「調剤用」2%	0.25～1mL	0.5～1.25mL	0.75～2mL	3～6mL

■【効能・効果】【禁忌を含む使用上の注意】等については、最新の添付文書をご参照ください。

ニプロESファーマ株式会社