


ドネペジル塩酸塩OD錠「ニプロ」

～服用にあたって注意いただくこと～

服用される患者さんにご家族・介護の方へお渡しください。



アルツハイマー型認知症用

ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「ニプロ」

ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「ニプロ」

ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「ニプロ」

ニプロESファーマ株式会社

ドネペジル塩酸塩OD錠「ニプロ」 ～服用にあたって注意いただくこと～

OD錠は、口の中で崩れます。少しの水で飲み込んでください。

OD錠



3mg



5mg



10mg

- ① 1日1回お飲みください。
- ② お薬の量は主治医の指示に従ってください。
1日3mg (黄色の錠剤) から開始し、1～2週間後に
1日5mg (白色の錠剤) になります。
(お薬の量を少しから始めるのは、お薬に体を徐々に慣れさせていくためです。)
その後、症状の進行に合わせて1日10mg (ピンク色の錠剤)
になります。
- ③ 飲み忘れても2日分を一度に飲まないでください。
- ④ お薬の服用を、**ご自身やご家族の判断で中止しない**でください。
- ⑤ お薬はシートから取り出してお飲みください。
- ⑥ 1回分ずつお薬がまとめられている場合があります。

服薬チェックシート

薬の飲み忘れがないかをチェックするためのものです。服用後、1枚ずつカレンダーに貼ってお使いください。

※チェックシートをご希望の場合は、
医療機関へお問い合わせください。



このお薬を飲まれる方へ

OD錠



3mg



錠剤 (実物大)



5mg



錠剤 (実物大)



10mg



錠剤 (実物大)



製品に関するお問い合わせ先

ニフ.オ株式会社 医薬品情報室

 **0120-226-898**

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)

2DNPZ308G-
2024年1月作成
[審2401097246]