


ドネペジル塩酸塩内用液「タナベ」

～服用にあたって注意いただくこと～

このお薬は「飲みぐすり」です

梅風味です

服用される患者さんにご家族・介護の方へお渡しください。



アルツハイマー型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩内用液 **3mg**「タナベ」

ドネペジル塩酸塩内用液 **5mg**「タナベ」

ドネペジル塩酸塩内用液 **10mg**「タナベ」



吉富薬品株式会社

ニプロESファーマ株式会社

ドネペジル塩酸塩内用液「タナベ」

～服用にあたって注意いただくこと～

内用液 3mg



内用液 5mg



内用液 10mg



- 1 日 1 回 お飲みください。
- 2 お薬の量は主治医の指示に従ってください。
1 日 3mg から開始し、1～2 週間後に 1 日 5mg になります。
(お薬の量を少しから始めるのは、お薬を体に徐々に慣れさせていくためです。)
その後、症状の進行に合わせて 1 日 10mg になります。
- 3 飲み忘れても 2 日分を一度に飲まないでください。
- 4 お薬の服用を、**ご自身やご家族の判断で中止しない**でください。

服薬チェックシール


薬の飲み忘れがないかをチェックするためのものです。服用後、1枚ずつカレンダーに貼ってお使いください。

※チェックシールをご希望の場合は、医療機関へお問い合わせください。



このお薬は「飲みぐすり」です 梅風味です

開け方 図のように「押さえる」の表示部分を持って切り口から開けてください。
※ほかの部分を持って開けると中身が飛び出ることがあります。



飲み方



● スプーンやコップに移して飲む場合



● 直接、切り口から飲む場合
切り口で口内を傷つけないよう注意してください。

※飲みづらい場合は、少量の水などと混ぜて飲むこともできます。

ごえん

誤嚥（飲食物や薬が気管に入り、むせる）を防ぐために…

この薬を飲むときは、寝たままの状態では飲まないように、体を起こしてください。
起き上がることが困難な場合は、少し上体を起こしてお飲みください。

飲みやすくする工夫

● 混ぜてもよいもの

白がゆ、味噌汁、麦茶、水、スポーツ飲料、オレンジジュース、りんごジュース、牛乳、バニラのアイスクリーム、野菜ジュース、コーヒー、プリン、ヨーグルト等



● 混ぜるのがすすめられないもの


茶葉成分が入っているお茶（緑茶、紅茶、ウーロン茶）

- 1 開封後はすみやかに全量を服用してください。
- 2 子供の手の届かない所に保管してください。
- 3 目・鼻・耳に使用しないでください。



製品に関するお問い合わせ先

ニフ.オ株式会社 医薬品情報室

 **0120-226-898**

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)