

服用にあたって

モンテルカスト錠「タナベ」を お飲みになる患者さんへ



ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

日本薬局方 モンテルカストナトリウム錠

モンテルカスト錠 5mg「タナベ」

モンテルカスト錠 10mg「タナベ」

モンテルカスト錠「タナベ」を お飲みになる患者さんへ

モンテルカスト錠「タナベ」は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎の治療に用いられます。気道・鼻粘膜の炎症を起こしたり気道を収縮させるロイコトリエンという物質の働きを抑えて、気管支喘息やアレルギー性鼻炎の諸症状を改善します。気管支喘息に伴う咳や喘鳴、息苦しさなどの症状を起こりにくくし、また、アレルギー性鼻炎に伴う鼻づまり、鼻水、くしゃみなどの症状を改善します。

注意：気管支喘息については、既に起こっている発作を止める薬ではなく、発作を予防する薬です。発作を止めるには他の薬を使ってください。



おくすりの飲み方と量

- 気管支喘息の場合
 - アレルギー性鼻炎の場合
- ◆通常、1日1回就寝前に、錠をお飲みください。
- ◆おくすりの飲み方と量は、あなたの年齢や症状にあわせて、医師が決めます。指示のとおりに飲んでください。

飲み方

- ① 飲むときはコップ1杯程度の水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。
- ② 飲み忘れた場合は、気がついた時に、すぐに1回分を飲んでください。
ただし、次の通常飲む時間が近い場合には、忘れた分は飲まないで、次の通常の飲む時間に1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ③ 誤って多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ④ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないでください。

おくすりを飲むときに注意すること

- ◆おくすりはPTPシートから取り出してお飲みください。
- ◆次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。
 - ・以前におくすりを使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
 - ・妊娠中、妊娠している可能性がある、授乳中。
 - ・他におくすりを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。
- ◆保管上の注意
 - ・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
 - ・おくすりが残った場合、保管しないで廃棄してください。

このおくすりを使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

- ◆主な副作用として、下痢、腹痛、吐き気、胸やけ、頭痛、肝機能異常、口渴、傾眠、胃不快感、倦怠感、発疹、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。
- ◆まれに下記のような症状があらわれ、〔 〕内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・冷汗、顔面蒼白、呼吸困難 [アナフィラキシー]
- ・息苦しい、顔・舌・咽頭の腫れ [血管浮腫]
- ・食欲不振、全身倦怠感、皮膚や結膜などが黄色くなる [劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸]
- ・発熱、眼の充血、皮膚・粘膜の発疹・紅斑・水疱 [中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑]
- ・鼻血、歯ぐきの出血、四肢などの皮下出血 [血小板減少]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。

上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

医療機関・薬局名



製品に関するお問い合わせ先

ニフロ株式会社 医薬品情報室

TEL 0120-226-898

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)