


服用にあたって

クエチアピン錠「ヨシトミ」を
服用する患者さんをご家族の方へ



抗精神病剤

日本薬局方 クエチアピンフマル酸塩錠

クエチアピン錠 25mg「ヨシトミ」

クエチアピン錠 100mg「ヨシトミ」

クエチアピン錠 200mg「ヨシトミ」



吉富薬品株式会社

ニプロESファーマ株式会社

クエチアピン錠25mg・100mg・200mg「ヨシトミ」 を服用する患者さんとご家族の方へ

□ 25mg



□ 100mg



□ 200mg



服用する前に確認すべきこと

- 糖尿病の方
- 糖尿病といわれたことのある方

このお薬は服用して
いただけません。

- ご親族に糖尿病になった方がいる方
- 血糖値が高い方
- 肥満傾向の方
- 体重が増加してきた方

糖尿病になりやすい方ですの
で、服用される前に必ず医師
もしくは薬剤師に、相談して
ください。

服用中に気をつけること

- 血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。
- 血糖値の変化をみるため、定期的に血糖値の測定を行う場合があります。

- 激しいのどの渇き
- 水・お茶・清涼飲料水などを
たくさん飲む
- おしっこの量が多くなる
- 何回もトイレに行く

このような症状に
気づいたときは、
すぐに医師または
薬剤師に連絡して
ください。

■ このお薬の飲み方

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、
医師が決めます。コップ1杯程度の水または
ぬるま湯で飲んでください。



■ 飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。
気が付いた時に、1回分を飲んでください。
ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、
次の時間に1回分を飲んでください。




■ このお薬を飲んだ後に自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。

■ このお薬を服用中は、飲酒は控えてください。

■ 妊婦または妊娠している可能性のある方は
医師に相談してください。また、このお薬を
服用中は授乳を避けてください。

■ 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を
購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師
または薬剤師に伝えてください。

■ その他、気になることがありましたら、医師または薬剤師
に相談してください。



医療機関名



製品に関するお問い合わせ先

ニフ.ロ株式会社 医薬品情報室

☎ 0120-226-898

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)