

リセドロン酸Na塩錠2.5mg・17.5mg「タナベ」を
服用される患者様へお渡しください。

使用中に気をつけなければ
ならないこと



骨粗鬆症治療剤

日本薬局方 リセドロン酸ナトリウム錠

リセドロン酸Na塩錠 2.5mg「タナベ」

リセドロン酸Na塩錠 17.5mg「タナベ」

リセドロン酸Na塩錠 2.5mg・17.5mg「タナベ」

使用中に気をつけなければならないこと


▶ 薬や食べ物が飲み込みにくい、飲み込むとき
に痛み、胸の痛み、胸やけなどの症状があら
われた場合には、**使用を中止してただちに主
治医に相談してください。**(のど、食道、胃
などに傷害が発生している可能性があります)



▶ 口の痛み、口のはれ、発赤、歯が浮いた感じ、歯のゆるみ、
歯ぐきの腫れ、あごの痛み・しびれ感、あごが重たいなどと
いった症状があらわされた場合は、**ただちに歯科または口腔外
科を受診してください。**(あごの骨の壊死(えし)、あごの骨
の骨髄炎(こつずいえん)が発生している可能性があります)

この副作用の報告の多くが**抜歯などの歯の治療に関連して**
あらわれています。

- ① 医師と相談の上、必要に応じて
この薬を使い始める前に歯科検
査を受け、できるだけ抜歯など
の治療を済ませてください。
- ② ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
- ③ 定期的に歯科検査を受けてください。
- ④ 歯科・口腔外科を受診する際には、この薬を使用している
ことを必ず歯科医師に告げてください。
- ⑤ この薬を使用している間は、抜歯などの治療ができるだけ
避けてください。



- ▶ 食事などから十分なカルシウムを摂ってください。
- ▶ この薬を長く使用した人で、**太ももの付け根のあたりが骨折**したとの報告があります。この骨折の起きる前の症状として、**太ももや太ももの付け根の痛みがあらわれることがある**ので、これらの症状があらわれた場合には、ただちに主治医に相談してください。
- ▶ **妊婦、妊娠している可能性がある人**、または**妊娠する可能性がある人**は**主治医**に相談してください。
- ▶ 授乳は避けてください。
- ▶ **他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入**する場合は、必ず**この薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。**





製品に関するお問い合わせ先

ニフロ株式会社 医薬品情報室

0120-226-898

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)