

服用にあたって

リセドロン酸Na塩錠17.5mg「タナベ」を
服用される患者さんへお渡しください。



骨ページェット病用

日本薬局方 リセドロン酸ナトリウム錠

リセドロン酸Na塩錠 17.5mg 「タナベ」

ニプロESファーマ株式会社

リセドロン酸Na塩錠 17.5mg「タナベ」の

のみ方

毎日1回1錠を8週間のむ、
骨ページェット病のお薬です。

おくすりを
のむときに注意すること



① 1日1回1錠を、8週間連続 でのんでください。

② 朝、起きた時に1錠をコップ1杯(約180mL)の
水かめるま湯 でのんでください。



口の中で、かんだりつぶしたりせずにのんでください

おくすりを のんだあと注意すること

③ のんでから 少なくとも 30分間 は



▶ 横にならない でください。

▶ 水・ぬるま湯以外の 飲食はしない でください。

▶ 他のお薬をのまない でください。

おくすりを のみ忘れたとき

食べ物、飲み物を 口にした 場合、
他のお薬を のんだ 場合

翌日の朝に
1錠のんでください。

食べ物、飲み物を 口にしていない 場合、
他のお薬を のんでいない 場合

すぐおのみください。

のんだ後は、30分間は横にならず、水以外の飲食もさけてください。

(裏面もご覧ください)

リセドロン酸Na塩錠 17.5mg「タナベ」



Q1 起きてすぐ、朝食前にのむのは？

A1 胃に何も入っていない空腹時の方が、お薬の効果がうまく発揮されるからです。

1日1回



Q2 コップ1杯の水(ぬるま湯)で嚥まずにのむのは？

A2 お薬を一気に胃の中に届けるためです。のどや食道にお薬がひっかかると炎症をおこす可能性があります。このため、口の中で嚥んだり、溶かしたりしないでください。

Q3 のんでもから30分間は、水以外の飲食や他のお薬をのんだり、横になつてはいけない理由は？

A3 胃の中に水以外のものがあると、お薬の吸収を悪くするからです。お茶やコーヒー、牛乳、ミネラルウォーターなどもくすりの吸収を妨げます。30分以上たてば、お薬が吸収されてしましますので、飲食することができます。また、のんでもから横になると、お薬が逆流して食道を刺激することがあります。座ったり、動いたりすることは問題ありません。

- のみ込みにくく感じたり、のみ込むときの痛み、胸の痛みや胸焼けのような症状に気がついたときは、服用を中止して、主治医または薬剤師に相談してください。
- 口の中は、いつも清潔に保つようにしましょう。

●歯の治療を受ける際は、事前に主治医に相談してください。

●歯科医にリセドロン酸をのんでいることを伝えてください。



製品に関するお問い合わせ先

ニフロ株式会社 医薬品情報室

0120-226-898

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)