クロピドグレル錠25mg「ニプロ」
クロピドグレル錠75mg「ニプロ」

を服用される患者さんへ

（実物大）





（実物大）

クロピドグレル錠「ニプロ」は、
血液を固まりにくくして、

おくすりを飲むときに注意すること

1 このおくすりは、体調が良くなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化したり、再発することがあります。医師の指示どおりに飲み続けることが重要です。

2 主に飲み始めの2カ月以内に、肝障害や血液障害などの副作用が起きることがあります。医師の診察を受け、血液検査など、指示に従ってください。

血管が詰まるのを防ぐおくすりです。

3 他の医師を受診する場合、特に手術や歯の治療を受けるときには、このおくすりを飲んでいることを医師に必ず伝えてください。

4 飲み忘れた場合は、気づいたときに1回分飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の飲む時間に1回分飲んでください。決して2回分を一度に飲まないでください。

5 このおくすりを飲んで、いつもと違う症状に気づいたら、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

◎ からだがだるい、発熱、さむけ

◎ 白目が黄色くなる、
まぶたや目の充血

◎ 鼻や歯ぐきからの出血、唇や口内のただれ

◎ 発疹・水ぶくれができる、皮膚が黄色くなる、
あおあざができる、皮膚の広い範囲が赤くなる

◎ 尿の色が濃くなる、尿が茶色くなる、
便が黒くなる、血が混ざった便

◎ 腹痛、吐き気、食欲不振

NIPRO

2018年3月作成（MP）