

使用説明書

ロキソプロフェンNaゲル1%[NP]の 使用方法

- 1日数回、痛いところに薄くひろげて、患部の広さにあった量を塗ってください。
- 入浴前に使用すると薬剤が流されてしまいますので、入浴後にご使用ください。
- チューブからしぼり出した長さの量(g)は以下をご参照ください。

0	1	2	3	4	5 (cm)
	(0.3g)	(0.6g)	(0.9g)	(1.2g)	(1.5g)



ロキソプロフェンNaゲル1%[NP]を ご使用の患者さんへ

- 本剤の成分で過敏症を起こしたことがある方、アスピリンぜんそくのある方または起こしたことがある方は使用しないでください。
- 気管支ぜんそくのある方は、使用前に医師または薬剤師に相談してください。
- 必ず医師・薬剤師に指示された使用方法を守って使用してください。
- 損傷皮膚、眼や粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。また、この薬を塗った手で傷口や眼に触れないように注意してください。
- 使用後、かゆみ、発疹、発赤、かぶれ、胃不快感などの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- この薬を塗った部分をラップフィルムなどでおおわないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- キャップをよくしめて直射日光や高温をさけて涼しいところで保管してください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。