

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニプロ」 を使用される方へ

監修：康村綾子先生（本町皮膚科クリニック 院長）

- 医師の指示に従ってお使いください。
- 朝起きたとき、水仕事のあと、寝る前、入浴後などの1日1～数回、患部に噴霧してください。
- 汗や汚れを落とした清潔なお肌にお使いください。
- 入浴後は、からだをきれいにふいた後5分以内に噴霧すると効果的です。



使用方法

- ◆ 初めてお使いの時は、立てた状態で、液が噴霧するまで空押し（数回～10回程度）してから使用してください。
- ◆ 噴霧方向を確認して噴霧してください。（プッシュ部天面に噴霧方向を示す矢印を設けています）



噴霧口



プッシュ部天面

矢印は噴霧方向
を示しています


- ◆ このスプレー容器は逆さにしても噴霧できます。



噴霧距離と噴霧面積の目安

約10cm離して噴霧すると1回で手のひら1つ分の面積に噴霧できます。

(スプレー容器を逆さにして噴霧しても同様です)



ご使用上の注意

- ◆皮膚がただれているところや傷口には噴霧しないでください。
- ◆目、口、耳、鼻の中に入らないようにご使用ください。万一、入った場合は、(目、口の場合は直ちにきれいな水で洗い流してから、) 医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆呼吸でお薬を吸い込まないようご注意ください。顔面に使用する場合は特にご注意ください。
- ◆本剤を使用して、皮膚が赤くなったり、かゆみがあられるなどの異常が出た場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆残量が少なくなるなどでノズル内に空気が入った時、お薬が出にくくなることがあります。そのときは、立てた状態で、お薬が出るまで何度か空押ししてください。
- ◆噴霧口にキズがつくと、噴霧できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
- ◆ご不明な点は医師にご相談ください。

保管上の注意

- 使用後は噴霧口に付着したお薬を清潔な布などでふき取り、きちんとキャップをして保管してください。
- 高温、直射日光をさけ、涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

