


アトルバスタチン錠「NP」

を服用される患者さんへ



このお薬について

アトルバスタチン錠「NP」は、余分なコレステロールの合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、副作用としてごくまれに「横紋筋融解症^{おうもんきんゆうかいしやう}」が起こることが知られています。

服用しはじめてから次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症^{おうもんきんゆうかいしやう}の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医又は薬剤師にご相談ください。

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足の力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い（赤褐色になる）など

副作用はどのお薬でもありますが、早期に発見し適切な処置を行えば大事に至ることはほとんどありません。

また、ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じられましたら、主治医又は薬剤師にご相談ください。

「横紋筋融解症」とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し、尿が出にくくなる）になることもあります。

注意事項

- ❗ このお薬は、副作用として「劇症肝炎、肝炎、肝機能障害、黄疸」が起こることがあります。吐き気がする、全身がだるい、皮膚や白目が黄色くなる等の症状がみられましたら、主治医又は薬剤師に相談してください。
- ❗ グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなる場合がありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- ❗ 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ❗ 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ❗ 医師の指示なしに、ご自分の判断で飲むのを止めないでください。
- ❗ 乳幼児・小児の手の届かないところで、直射日光・高温・湿気を避けて保管してください。



施設名