

クエチアピン錠「ニプロ」 を服用する患者さんとご家族の方へ

錠25mg「ニプロ」



実物大

錠100mg「ニプロ」



実物大

錠200mg「ニプロ」



実物大

クエチアピン
25mg「ニプロ」



80%縮小

クエチアピン
100mg「ニプロ」



80%縮小

クエチアピン
200mg「ニプロ」



80%縮小

服用する前に
確認するべき事

- 糖尿病の方
- 糖尿病といわれたことのある方

このお薬は服用して
いただけません。

- ご親族に糖尿病になった方がいる方
- 糖尿病になるリスクがある方
 - 血糖値が高い
 - 肥満がある

服用される前に
必ず医師もしくは薬剤師に、
相談してください。

服用中に気をつけること

- ◎血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。
- ◎血糖値の変化を見るため、定期的に血糖値の測定を行なう場合があります。

- 激しいのどの渴き
- 水・お茶・清涼飲料水などを
たくさん飲む
- おしっこの量が多くなる
- 何回もトイレに行く

このような症状に
気づいたときは、
すぐに医師または
薬剤師に連絡して
ください。

● このお薬の飲み方

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。カップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。



● 飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。



● このお薬は、眠気や注意力・集中力・反射運動能力などの低下を起こすことがあります。自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないでください。



● アルコール飲料は、このお薬に影響しますので、控えてください。



● 妊婦または妊娠している可能性のある方は医師に相談してください。また、このお薬を服用中は授乳を避けてください。



● 他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。



● その他、気になることがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。