



# 保護者の方へ レボセチリジン塩酸塩シロップ 0.05%「ニプロ」の 服用方法



- 飲む量は、お子さんの症状などにあわせて医師が決めます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 通常、1回 [ ] mL を、1日 [ ] 回 飲ませてください。  
(※1日2回の場合の服用タイミング：朝食後と夜寝る前)
- 特有の香り(フルーツ風味)の甘いシロップ剤です。
- 容器のふたを開けている間は、お子さんから目を離さないよう、十分ご注意ください。
- このお薬は、アレルギーの原因となる物質(ヒスタミン)や炎症をおこす物質の作用を抑え、アレルギー症状を改善するお薬です。症状がなくなった場合でも服用を中止せずに、医師の指示に従ってください。
- このお薬を飲んで、もし体調が悪くなった場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点は、医師または薬剤師にご相談ください。



# 服薬応援シール



このシールは、毎日<sup>まいにち</sup>の服薬<sup>ふくやく</sup>を確認<sup>あくわく</sup>するためのものです。レボセチリジン<sup>塩酸塩</sup>シロップ<sup>0.05%「ニプロ」</sup>を飲<sup>の</sup>まれた際に、カレンダーに貼るなどしてご活用ください。

