

ガランタミン OD錠「ニプロ」を 服用される方とご家族・介護者の方へ

- 必ず医師・薬剤師から指示された服用方法に従ってください。
- この薬を飲みはじめるときは、体を薬に慣らすために次のように服用します。



※増量する場合は変更前の用量で4週間以上服用した後に增量します。

- この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。唾液や水で飲みこんでください。ただし、寝たままの状態で服用する場合は、水で服用してください。
- 清涼感のあるオレンジ風味のOD錠です。

服用にあたっての注意事項

- ご自身の判断で服用を中止したり、薬の量を加減したりすると、本来の効果が得られないことがあります。医師、薬剤師の指示どおりに服用することが大切です。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。決して2回分を一度に飲まないでください。
- 主な副作用として、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、食欲減退、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたり、その他気になる症状がある場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 一般に、吐き気等の消化器症状は、食後に投与することで軽減される可能性がありますので、食後に服用するようにしてください。

保管にあたっての注意事項

- 誤って飲んでしまわないよう、子どもの手の届かないところに保管してください。

