

# ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム 2.5μg「ニプロ」をお飲みになる方へ

- このお薬は、かゆみを改善するお薬です。
- お薬の量や飲み方は医師または薬剤師の指導を正しく守ってください。



“ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」”は  
長方形のごく薄いフィルム状のお薬です。



このお薬の  
原寸大写真です。  
サイズ(14mm×20mm)


## お薬の取り出し方

- ミシン目にそって1回分を切り離してください。
- かわいた手指で、袋の上部を両側に広げるように開き、白色のフィルム状のお薬を取り出してください。

① ミシン目にそって1回分  
を切り離します



② ゆっくりと  
開きます




- \*お飲みになる直前に取り出してください。
- \*水に溶けやすいので、濡れた手で取り出さないでください。
- \*勢いよく開封すると、中のお薬が飛び出す場合があります。

## 飲み方

- フィルム状のお薬を舌の上にのせ、唾液で溶かして飲み込みます。
- 上あごなどに張り付くことがあります、そのまま口の中で溶かして飲み込んでください。

- \*飲みにくいときは、水またはぬるま湯で飲んでください（寝たままの状態では、水なしで服用しないでください）。
- \*このお薬は、口中では吸収されません。必ず飲み込んでください。



## 注意事項

### ○もし飲み忘れたら

- ・夕食後の服用を指示されている場合、飲み忘れに気が付いたのがその日の就寝前ならば1回分を飲んでください。
- ・それ以外の場合は1回分をとばして、次の通常飲む時間に1回分を飲んでください。2回分を一度に飲まないでください。また、誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。

### ○血液透析を受ける際は、このお薬を飲んでから十分な時間をあけてください。

### ○腹膜透析において透析液交換を行う際は、このお薬を飲んでから十分な時間をあけてください。

### ○医師の指示なしに服用をやめないでください。

### ○眠気、めまいなどがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には従事しないでください。

### ○グレープフルーツジュースはこの薬の作用を強めることができますので、同時に服用しないようにしてください。

## 注意事項（続き）

○次の症状に気付いたら、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 全身がだるい
- 食欲がない

- 皮膚や白目が黄色くなる

○次の症状に気付いたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

- 不眠
- 便秘
- 眠気
- 嘔吐
- 頻尿
- 夜間頻尿

## 保存方法・その他

○直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。

○乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。

○わからないことや気になることがあれば、医師または薬剤師におたずねください。

施設名