


骨ページェット病の患者さんへ リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」の のみ方とご注意




毎日**1**回**1**錠
8週間連日

8Weeks

朝起きたときに



コップ1杯の
水または
ぬるま湯で



のんでから30分間横にならない、食事をしない。

朝起きたときに

胃の中に食べ物などがあると、お薬の吸収が悪くなります。このお薬は、胃が空っぽのとき、お薬がよく吸収されるので、朝起きたときにのみましょう。

コップ1杯の水またはぬるま湯で

お薬が食道にとどまると粘膜に刺激を与える可能性があります。また水以外の飲み物（お茶や牛乳など）でのむと、お薬が十分に吸収されず効果が弱くなります。十分な量（コップ1杯約180cc）の水またはぬるま湯でお薬を確実に胃に届けましょう。

※ミネラルウォーターで服用する際は、海外産や海洋深層水等の硬度の高いものは避けてください。

のんでから30分間 横にならない・食事をしない・他のお薬ものまない

すぐ横になるとお薬が食道にとどまったり、逆流したりして粘膜に刺激を与える可能性があります。また30分以内に食事や水以外の飲み物をとると、お薬の吸収が悪くなります。のんでから30分間は横にならず、水以外の飲食はせず、他のお薬ものまないようにしましょう。

下記のような症状や異常を感じた場合は、すみやかに医師、薬剤師にご相談ください。

- 食べ物が飲み込みにくい、飲み込むときにのどが痛い、胸に痛みを感じる など
- 体がだるい、力が入らない、食欲不振、発熱、皮膚や白目が黄色くなる など
- あごの痛みやしびれ・だるさ、歯ぐきのはれ、歯のぐらつき など

！ お薬をのみ忘れたとき…

食べ物、飲み物を口にした場合、
他のお薬をのんだ場合

▶ 翌日の朝に1錠のんでください。

食べ物、飲み物を口にしていない場合、
他のお薬をのんでいない場合

▶ すぐおのみください。

のんだ後は、30分間は横にならず、水以外の飲食もさけてください。

※ご不明な点、疑問点は医師または薬剤師におたずねください。

■医療機関名