

タクロリムスカプセル「ニプロ」

を服用される患者さんへ

⚠ 服用にあたっての注意点

- 服用する直前に包装から取り出して服用してください。
- 必ず医師の指示に従い、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- **高齢者の方は**特に医師の指示を守って服用してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で服用する量や回数を変えたり、服用を中止したりしないでください。
- **飲み忘れた場合は、**

<臓器移植および骨髄移植を受けられた方 / 潰瘍性大腸炎患者の方>

気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。

次に服用する時間は、5時間以上間隔をあけてください。

<重症筋無力症患者の方 / 関節リウマチ患者の方 / ループス腎炎患者の方>

その日のうちに気がついた時はできるだけ早く1回分を服用してください。

翌日気がついた時は忘れた分を服用せずに、次の服用時間に1回分を服用してください。

絶対に2回分を一度に服用したり、服用時間を変更したりしないでください。

- **誤って多く服用した場合は、**すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- グレープフルーツ（ジュース）は、このお薬の作用を強めることがありますので、これらを一緒に飲食することは避けてください。
- セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含有する食品は、このお薬の作用を弱めることがありますので、これらを一緒に服用することは避けてください。
- このお薬により、体の抵抗力が弱まりかぜなどの感染症にかかりやすくなる場合があります。人混みを避けたり、外出後は手洗いやうがいなどを行い、感染症にかからないように注意してください。

⚠ 以下に該当する方は、必ず医師または薬剤師に相談してください。


- 以前にお薬を服用して発疹やかゆみなどが出たことのある方
- 他のお薬を服用している方（薬局で買ったお薬も含めて）
- 妊婦または妊娠の可能性のある方 授乳中の方
- 予防接種を受ける予定のある方

裏面もご覧ください。

! 以下のものとの併用には十分注意する必要があります。
 該当するものがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

	タクロリムスの作用が 強くなることがあるもの	タクロリムスの作用が 弱くなることもあるもの
抗てんかん剤		カルバマゼピン、フェノバルビ タル、フェニトイン
抗生物質	エリスロマイシン、ジョサマイシン、クラリス ロマイシン	リファンピシン、リファブチン
抗真菌剤	イトラコナゾール、フルコナゾール、ポリコナ ゾール 等	
カルシウム 拮抗剤	ニフェジピン、ニルバジピン、ニカルジピン、 ジルチアゼム 等	
プロテアーゼ 阻害剤	リトナビル、サキナビル、ネルフィナビル、テラ プレビル、グラゾプレビル、レテルモビル、 オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビル	
その他	プロモクリプチン、ダナゾール、エチニルエス トラジオール、オメプラゾール、ランソプラゾ ール、トフィソパム、アミオダロン	
飲食物	グレープフルーツジュース	セイヨウオトギリソウ(セント・ ジョーンズ・ワート) 含有食品

あなたの飲む量は

タクロリムスカプセル「ニプロ」			朝 ☀	夜 🌙
0.5mg	 表	 裏	カプセル	カプセル
1mg	 表	 裏	カプセル	カプセル
5mg	 表	 裏	カプセル	カプセル

カプセル本体(実物大) PTPシート(縮小40%)

※タクロリムスカプセル 5mg「ニプロ」には「重症筋無力症」、[「関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限り)』及び「ループス腎炎(ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合)』の適応はございません。

他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

その他わからないことや気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

主治医または薬剤師の連絡先