

イマチニブ錠「ニプロ」

を服用される患者さんへ

必ず、主治医または薬剤師の指示通りに服用してください。

年 月 日 ~ 年 月 日

あなたの飲む量は

イマチニブ錠
100mg「ニプロ」

イマチニブ100mg「ニプロ」

イマチニブ イマチニブ



[80%縮小]

表面

側面

裏面



錠

イマチニブ錠
200mg「ニプロ」

イマチニブ200mg「ニプロ」

イマチニブ イマチニブ



[80%縮小]

表面

側面

裏面



錠

このお薬を飲むときの注意点

- このお薬は毎日続けて服用しないとお薬の効果は現れません。自分の判断で**服用を中止したり服用量を変えたりしないで**ください。
- 胃などへの負担を出来るだけ少なくするため、**食後に多めの水で服用**してください。
- このお薬を服用中は**グレープフルーツジュースやセイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を避けて**ください。
- めまいや眠気、目のかすみが見ることがありますので、高いところでの作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときには注意してください。
- 間違えて多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- 飲み忘れた場合は、気づいてもすぐ服用せず、次回の服用時に1回分を飲んでください。絶対に2回分をいっきに飲まないでください。
- お薬の効果の確認や副作用を早く見つけるためにも、定期的に診療・検査を受けてください。
- 他の医師を受診する場合や薬局などで他の薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

**このお薬を服用中に次のような症状が見られたら、
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。**

主な副作用

浮腫(むくみ)、発疹、嘔気・嘔吐、発熱、倦怠感 など

■浮腫(むくみ)



■発疹



■嘔気・嘔吐



保管方法、その他

- 乳幼児・小児の手の届かないところで、直射日光・高温・湿気を避けて保管してください。
- お薬が余った場合、廃棄の方法について薬局や医療機関に相談してください。

施設名