



ビカルタミド錠 80mg「NP」を 服用される患者さんへ

お気軽に声をかけてください。


副作用があらわれる時期や種類、どのような程度かは、患者さんによって異なります。必ずしも副作用が出るとは限りませんが、もし副作用があらわれた場合は、すぐに医師、看護師、薬剤師に相談しましょう。

かかりつけの病院情報

病院名

担当の先生

TEL



A1-5000 1605(NP)



監修：和歌山県立医科大学 泌尿器科 教授

原 勲 先生

服薬ガイドについて

ビカルタミド錠80mg「NP」は、前立腺がんの治療薬です。前立腺がんに対する男性ホルモンの作用をブロックすることで、がん細胞の増殖を抑えます。

この小冊子は、ビカルタミド錠80mg「NP」の作用、服用方法、副作用などについて患者さんに知っておいていただきたいことをまとめた服薬ガイドです。

薬を正しく理解していただくための資料として、また、医師、看護師、薬剤師と話し合うための資料として、ぜひお役立てください。



どんな薬
ですか？

P4

薬の作用について

服用方法は？

P6

服用時の注意点について

どんな
副作用が
ある？

P8

注意したい症状について


Q&A

P10

よくある質問について

どんな薬ですか？

ビカルタミド錠 80mg「NP」は、男性ホルモンの働きを抑える薬です。



前立腺は、男性生殖器のひとつで、その働きは体内でつくられる男性ホルモンの支配されています。このため前立腺に発生したがんも同じように、男性ホルモンの影響を受けます。

男性ホルモンが、がん細胞内にある男性ホルモンの受容体と結合すると、がん細胞の増殖を促進させます。ビカルタミド錠 80mg「NP」は、こうした作用を妨げる薬です。男性ホルモンの受容体に先回りして結合することで、男性ホルモンの働きをブロックし、がん細胞の増殖を抑えます。



服用方法は？

医師の指示に従って、1日1回、1回1錠。
決められた時間に飲んでください。

【服用のしかた】

1日1回、1回1錠。
コップ1杯ぐらいの水、
またはぬるま湯で飲んで
ください。

※ 薬は包装(PTP シート)から
取り出して飲んでください。



服用するときに注意していただきたいこと

- 医師の指示に従って、決められた時間に飲んでください。
- 以前に、薬を飲んで発疹などが出たことがある方、肝臓に病気のある方は、服用前に医師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で服用を中止しないでください。
- 高齢の患者さん、肝障害のある患者さんは、とくに医師の指示を守って服用してください。

こんなときの対処法

飲み忘れたとき

飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。
ただし、次の服用時間がせまっている場合は、忘れた分は飲まずに
1回分をとばしてください。

※ 絶対に2回分を一度に服用しないでください。


あやまって多く飲んでしまったとき

すぐに医師、看護師、薬剤師に相談してください。



どんな副作用がある？

次のような症状があらわれることがあります。
こんなときは、すぐにご相談ください。




乳房のふくらみ(乳房腫脹)

乳房の痛み(乳房圧痛)

乳房がふくらんだり、痛くなったり、張ったりすることがあります。また、乳首に痛みを感じることもあります。

肝機能低下

肝機能検査の数値に異常がみられることがあります。



顔や体のほてり、急な発汗
(ホットフラッシュ)

急にたくさんの汗が出たり、顔がほてったりすることがあります。

勃起力低下、性欲減退

勃起力低下や性欲減退など、性機能に障害があらわれることがあります。



気になる症状があらわれたときには、医師、看護師、薬剤師にすぐにご相談ください。

とくに注意すべき症状

※ [] 内に示した副作用の初期症状の可能性あります。

- 体がだるい (全身倦怠感)
- 皮膚や白目などが黄色くなる
- 食欲がない
- 発熱がある
- 吐き気がある
- 発疹が出る

[劇症肝炎、肝機能障害、黄疸]

- のどが痛い
- 内出血しやすい
- 発熱がある
- 出血が止まりにくい
- 鼻血、歯ぐきからの出血がある


[白血球減少、血小板減少]

- 息切れがする
- 発熱がある
- 息苦しい
- から咳が出る

[間質性肺炎]

- 胸の痛み
- 急激な胸の圧迫感
- 冷や汗が出る
- 体がだるい
- 息切れがする

[心不全、心筋梗塞]



すぐに医師に連絡してください。

Q1 ほかの薬やサプリメントを 飲んでいても大丈夫ですか？

ほかの薬やサプリメントを飲んでいる場合は、薬局で買った薬も含めて、医師、看護師、薬剤師にお伝えください。

また、ほかの病院を受診する場合や、薬局で薬を買う場合も、ビカルタミド錠 80mg「NP」を飲んでいることをお伝えください。




Q2 記載されている副作用以外で 気になる症状があるのですが…。

服用中に気になる症状があらわれたときは、すぐに医師、看護師、薬剤師に相談してください。わからないこと、不安なことなどがあれば、遠慮せずに相談することが大切です。

Q3 薬の保管方法について教えて ください。

ビカルタミド錠 80mg「NP」は、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。

また、小さいお子様の手が届かないところに保管してください。



Q4 薬が残ってしまったら？

薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受けとられた病院または薬局に相談してください。