

ニフェジピンCR錠「NP」

を服用される患者さんへお伝えください

医師または薬剤師のみなさまへ

本剤は素錠に3層のフィルム（溶出制御層、主薬層、遮光層）をコーティングした徐放剤であり、外層の遮光層及び主薬層は服薬後数分で溶けてきますが、溶出制御層内の素錠部は数時間以上かかって主成分が溶出してきます。以下の事項を服薬患者さんへ予めお伝えいただきますようお願いいたします。

- 割ったり、かみ砕いて服用した場合、上記製剤特性が失われ、急激な血中濃度上昇による重篤な副作用の発現や期待する効果が得られない可能性があること。
- 上記製剤特性のため、まれに錠剤の形状を残した製剤残渣が排出されることがあること。
- 体調や体質により排便が服用後数時間以内であれば、溶出制御層内の主成分が十分に溶出されないまま糞便中に排泄される可能性があること。
- 服用中に、血圧コントロール不良によると思われる症状を感じた場合は、医師または薬剤師に連絡すること。



指導箋は1枚ずつはがしてご使用ください

ニフェジピンCR錠「NP」

を服用される患者さんへ

この錠剤は1日1回～2回の服用で効果が発揮されるように設計された錠剤です。

服用すると錠剤の外側がすぐ溶けて効果を発揮したのち、内側がゆっくりと溶け出して効果を持続させます。割ったり、かみ砕いて服用した場合、血中濃度が高くなり、頭痛、顔面潮紅などの副作用が起こりやすくなったり、そのくすりの効果が得られない可能性がありますので、錠剤はそのまま服用してください。

体調(下痢等)により服用後短時間で排便された場合、まれに錠剤の形のまま糞便中に排出されることがあります。

もし、服用期間中に体調の異変を感じられましたら主治医または薬剤師にその旨をお伝えください。

病院・医院・薬局名



