

レボフロキサシン錠 500mg・250mg「ニプロ」の服用に際して 腎臓の働きが弱くなっている患者さんへ

患者さんの腎臓の働きが弱くなっていると、レボフロキサシン錠 500mg・250mg「ニプロ」の服用量を調整する必要があります。主治医または薬剤師の指示に従い、あなたの服用パターンに合った用量を正しく服用してください。

初診 でレボフロキサシン錠 500mg・250mg「ニプロ」を処方された場合の服用方法

	月 日 1日目	月 日 2日目	月 日 3日目	月 日 4日目	月 日 5日目
あなたの服用パターン <input checked="" type="checkbox"/>	500mgを 1日1回 服用後にチェック しましょう。 <input checked="" type="checkbox"/>	250mgを 1日1回 <input checked="" type="checkbox"/>			
あなたの服用パターン <input checked="" type="checkbox"/>	500mgを 1日1回 服用後にチェック しましょう。 <input checked="" type="checkbox"/>	服用なし	250mgを 1日1回 <input checked="" type="checkbox"/>	服用なし	250mgを 1日1回 <input checked="" type="checkbox"/>
あなたの服用パターン <input checked="" type="checkbox"/>	服用後にチェック しましょう。 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

再診 　でレボフロキサシン錠 500mg・250mg「ニプロ」を処方された場合の服用方法

	月 日 1日目	月 日 2日目	月 日 3日目	月 日 4日目	月 日 5日目
あなたの服用パターン <input checked="" type="checkbox"/>	250mg を 1日1回 服用後にチェック しましょう。 <input checked="" type="checkbox"/>	250mg を 1日1回 <input checked="" type="checkbox"/>			
あなたの服用パターン <input checked="" type="checkbox"/>	250mg を 1日1回 服用後にチェック しましょう。 <input checked="" type="checkbox"/>	服用なし	250mg を 1日1回 <input checked="" type="checkbox"/>	服用なし	250mg を 1日1回 <input checked="" type="checkbox"/>
あなたの服用パターン <input checked="" type="checkbox"/>	服用後にチェック しましょう。 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

お薬についてご不明な点や、
気になる症状がみられましたら、
主治医または薬剤師にご相談ください。

主治医または薬剤師の連絡先