
経皮鎮痛消炎剤

ミルタックス[®]パップ[®] 30mg

を使用される患者さんへ



処方時に
ミルタックス[®]パップ
30mgと
一緒に患者さんに
お渡しください。

販売
ニプロESファーマ株式会社

販売提携
ニプロ株式会社

製造販売
ニプロファーマ株式会社

経皮鎮痛消炎剤

ミルタックスパップ[®]30mg を使用される患者さんへ

ミルタックス[®]パップ30mgは、
鎮痛作用および抗炎症作用があり、
関節や筋肉の痛みをやわらげます。



ご使用にあたってのお願い

本剤の使用により光線過敏症こうせんかびんしょうが起きることがあります。皮膚がかぶれやすい体質の方、紫外線に弱い方は、使用前に医師または薬剤師にご相談ください。なお、この皮膚症状は誰にでも起こる可能性があるため、下記をよく読んでからご使用ください。

光線過敏症 とは


貼り薬などの外用薬を使用中あるいははがした後に、貼付部位に紫外線（日光）が当たって起こるかぶれです。
貼付部位にかゆみ、発疹・発赤ほっしん ほっせき、熱感、はれ、ヒリヒリ感などの皮膚症状が生じ、重症化するとまれに皮膚症状が全身に広がる場合もあります。

使用中の注意

本剤使用中は、貼付部位に紫外線を当てないようにしてください。また、はがした後もくすりは皮膚に残っていますので、使用中と同様に、少なくとも4週間は貼付部位に紫外線を当てないようにしてください。

屋外で活動するときは…

貼付部位に紫外線が当たらないように、天候にかかわらず薄手の服や白い生地しろいじの服は避け、濃い色の長袖の服、長ズボン、サポーターなどを着用しましょう。




- 使用中・使用後に、貼付部位にかゆみや発疹・発赤など皮膚の異常がみられた場合はすぐに使用を中止し、貼付部位に紫外線が当たらないようにして、医師または薬剤師にご相談ください。
- 妊娠後期の女性は使用しないでください。

本剤の貼り方(例)

汗をふき取り、患部を清潔にしてから貼ってください。


1 肩などに貼る場合




フィルムの丸い部分を持ってはがします。




粘着面を患部に貼った後、
残りのフィルムをはがします。




2 膝などに貼る場合



両手で持って左右に引きます。



粘着面を患部に貼った後、
残りのフィルムをはがします。



正しく安全にご使用いただくため、処方された患者さん以外の方は使用しないでください。

保管方法

- 直射日光や高温を避けて保管してください。
- 開封後は、開封口のチャックを合わせて袋を閉めて保管してください。

医療機関・薬局名

製品に関するお問い合わせ先

ニフ.ロ株式会社 医薬品情報室

 **0120-226-898**

受付時間：9時～17時15分(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)