

レニン・アンジオテンシン系阻害作用のある お薬を服用される **女性の患者さんへ**

妊婦又は妊娠している可能性のある女性は、
医師に相談してください。

- 妊娠中に使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼす可能性があります。
- 妊娠が判明した場合又は疑われる場合（月経遅延、つわり症状、基礎体温を測定している場合は高温期の持続など）は、医師に相談してください。
- 妊娠を計画する場合は、医師に相談してください。

医師は、このお薬を患者さんに必要と判断して処方しています。医師に相談なくお薬の使用を中止することのないようにお願いします。

妊娠中や妊娠希望の方のお薬に関する相談窓口として
「妊娠と薬情報センター」があります。

妊娠と薬情報センター
はこちら



(対象のお薬は、裏面の記載をご覧ください。)

対象製品一覧

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

- アジルサルタン錠 10mg/20mg/40mg 「ニプロ」
- イルベサルタン錠 50mg/100mg/200mg 「ニプロ」
- オルメサルタン OD 錠 5mg/10mg/20mg/40mg 「ニプロ」
- カンデサルタン錠 2mg/4mg/8mg/12mg 「ニプロ」
- テルミサルタン錠 20mg/40mg/80mg 「ニプロ」
- ロサルタンカリウム錠 25mg/50mg/100mg 「NP」
- その他〔 〕

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

- テモカプリル塩酸塩錠 1mg/2mg/4mg 「NP」
- その他〔 〕

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤含有配合剤

- ジルムロ配合錠 LD/HD 「ニプロ」
- カムシア配合錠 LD/HD 「ニプロ」
- テラムロ配合錠 AP/BP 「ニプロ」
- ロサルヒド配合錠 LD/HD 「ニプロ」
- その他〔 〕