

リバーロキサバンOD錠「ニプロ」 を服用される患者さんへ

OD錠10mg



OD錠15mg



錠剤(実物大)、PTPシート(60%縮小)

このお薬について

リバーロキサバンOD錠「ニプロ」は、血液を固まりにくくし、血管内で血液が固まらないようにする抗凝固薬というお薬です。

このお薬の飲み方

- 舌の上ののせて唾液を含ませると、水なしで飲むことができます。また、水で飲むこともできます。ただし、寝たままの状態では、水なしで服用しないでください。
- 飲み忘れた場合はすぐに1回分を服用しましょう。ただし、次の服用まで12時間以上空けるようしてください。翌日からは、毎日1回忘れずに服用するようにしましょう。
▲ 一度に2回分を飲まないでください。
- 医師の指示に従って服用してください。ご自身の判断で服用をやめたり、飲む回数を減らしたりしないでください。

裏面もお読みください ▶

このお薬を服用中の注意

- 歯の治療・内視鏡検査・手術を受ける予定があるときには、リバーロキサバンOD錠「ニプロ」を服用中であることを必ず事前に医師にお伝えください。
- 他の医療機関で治療を受ける場合や、薬局などで他の薬を購入するときは、リバーロキサバンOD錠「ニプロ」を服用中であることを必ず医師や薬剤師にお伝えください。
- これまで服用していた他の抗凝固薬が残っている場合は、必ず医師や薬剤師にお伝えください。決して、リバーロキサバンOD錠「ニプロ」と残っている抗凝固薬を一緒に服用しないでください。
- ▲ 服用中は、血が固まりにくくなるため、出血しやすくなります。**
以下のような症状が現れた場合には、
すぐに主治医の先生に連絡してください。

血便・血尿
(黒色便・赤い潜血便)



腫れ上がるような
皮下出血(あおあざ)がある



圧迫しても
出血がとまらない、
鼻血や歯ぐきからの
出血が続く



その他、出血が
気になるとき

※このほかにも気になる症状が現れた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- ▲ 服用中は、間質性肺疾患が現れることがあります。**
咳、血の混じった痰、呼吸困難、発熱等の症状が
現れた場合には、すぐに医師に連絡してください。



医療機関名