

アビラテロン酢酸エステル錠250mg 「ニプロ」を服用される患者さんへ

お薬の飲み方に関する注意事項です。

服用する前に冊子「アビラテロン「ニプロ」を服用される方へ」と一緒にご一読ください。
医師の指示なしに服用をやめないでください。

アビラテロン「ニプロ」は、前立腺がんの治療薬です。

男性ホルモンが作られるのを抑えるはたらきをもつお薬です。

アビラテロン酢酸エステル錠250mg「ニプロ」



PTPシート(80%縮小)錠剤(実物大)

飲み方

1 1日1回決められた量を毎日服用します。

通常1,000mg(1錠250mg×4錠)を1日1回服用します。

2 空腹時に服用してください。

※「空腹時」とは「食事の1時間以上前かつ食後2時間以降」です。

3 プレドニゾロンというお薬と一緒に服用します。

服用のタイミングは、必ずしも一緒ではなくて構いません。

プレドニゾロンは自己判断でやめず、医師の指示に従って服用してください。

※プレドニゾロンの服用に関しては、冊子「アビラテロン「ニプロ」を服用される方へ」をご一読ください。

アビラテロン「ニプロ」服用のタイミング

服用のタイミングは、医師または薬剤師の指示に従ってください。



例1 アビラテロン「ニプロ」を起床後に1日1回服用、 プレドニゾロン5mgを1日2回(朝昼)服用する場合



例2 アビラテロン「ニプロ」を朝食2時間後に1日1回服用、 プレドニゾロン5mgを1日1回(朝)服用する場合

