



プロトンポンプ・インヒビター
エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル

エソメプラゾールカプセル 10mg・20mg「ニプロ」

Esomeprazole Capsules

処方箋医薬品[※]

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

用法・用量早見表

エソメプラゾール カプセル10mg「ニプロ」



カプセル外観
(実物大)

PTPシート



エソメプラゾール カプセル20mg「ニプロ」



カプセル外観
(実物大)

PTPシート



2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 アタザナビル硫酸塩、リルピピリン塩酸塩を投与中の患者[10.1 参照]

●「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報等の詳細は、電子添文をご参照ください。

エソメプラゾール カプセル「ニプロ」

用法・用量の概要

適 応		通常 1回量		回数/日	投与期間	
		成人	1歳以上の幼児及び小児			
			体重20 kg以上			体重20kg未満
胃潰瘍		20mg	10～20 mg**	10mg	1回	8週間まで
十二指腸潰瘍		20mg	10～20 mg**	10mg	1回	6週間まで
吻合部潰瘍		20mg	10～20 mg**	10mg	1回	8週間まで
Zollinger-Ellison症候群		20mg	10～20 mg**	10mg	1回	—
逆流性 食道炎	治療	20mg	10～20 mg**	10mg	1回	8週間まで
	維持療法 (再発・再燃を 繰り返す場合)	10～20mg	—	—	1回	—
非びらん性胃食道逆流症		10mg	10 mg	10mg	1回	4週間まで
非ステロイド性抗炎症薬・ 低用量アスピリン投与時に おける胃潰瘍又は十二指腸 潰瘍の再発抑制		20mg	—	—	1回	—
ヘリコバクター・ピロリの 除菌の補助*		20mg	—	—	2回	7日間まで

*: エソメプラゾール (20mg/回) + アモキシシリン水和物 (750mg (カ匳)/回) + クラリスロマイシン (200～400mg (カ匳)/回); 2回/日、7日間

(左記治療が不成功の場合)
エソメプラゾール (20mg/回) + アモキシシリン水和物 (750mg (カ匳)/回) + メトロニダゾール (250mg/回); 2回/日、7日間

** : 体重20kg以上では症状に応じて1日1回経口投与する



A uthorized G eneric

AG (オーソライズド・ジェネリック) について

一般的には、有効成分だけではなく原薬、添加物、製法なども先発品と同じ後発品を指す。

後発品メーカーが、先発品メーカーの許諾 (Authorize) を受けて、製造販売するため、「オーソライズド・ジェネリック (AG)」と呼ばれている。

エソメプラゾールカプセル「ニプロ」は、有効成分、原薬、添加物、製法、製造工場、製造技術、効能・効果、用法・用量が先発品と同一のAGです。

製造販売元
(資料請求先)

ニプロ株式会社

大阪府摂津市千里丘新町3番26号
<https://www.nipro.co.jp/>

2023年10月作成 (MDX)

[審2308146193]