

アトモキセチン錠 5mg・10mg・25mg・40mg 「ニプロ」




体重別投与量早見表 (6歳以上18歳未満の患者)

監修 〓 おかざきよろず心のクリニック
院長 岩崎 寿史 先生

本資料では、18歳未満の患者さんの体重別に、アトモキセチンの用量と、錠剤で処方される場合の錠剤の組み合わせ例を記載しています。用量設定の目安としてご使用ください。

なお、投与量によっては、朝と夕の投与量に差が生じる場合があります。朝と夕のどちらの投与量を多くするかは、個々の患者さんの症状等にわせて決定しますが、本資料では、夕の投与量を多くした場合の組み合わせを紹介しています。



錠剤(拡大130%) PTP(縮小80%)

注意欠陥／多動性障害治療剤 (選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤)

劇薬、処方箋医薬品 (注意－医師等の処方箋により使用すること)

日本標準商品分類番号
871179
薬価基準収載

アトモキセチン錠 5mg「ニプロ」 10mg「ニプロ」 25mg「ニプロ」 40mg「ニプロ」

ATOMOXETINE TABLETS
(アトモキセチン塩酸塩錠)

- 2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)
 - 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
 - 2.2 MAO 阻害剤 (セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩) を投与中あるいは投与中止後 2 週間以内の患者 (「3. 相互作用」の項参照)
 - 2.3 重篤な心血管障害のある患者 [血圧又は心拍数を上昇させ、症状を悪化させるおそれがある。] (「2. 重要な基本的注意」、「10. その他の注意」の項参照)
 - 2.4 褐色細胞腫又はその既往歴のある患者 [急激な血圧上昇及び心拍数増加の報告がある。]
 - 2.5 閉塞隅角緑内障の患者 [散瞳があらわれることがある。]

3. 組成・性状

販売名	アトモキセチン錠5mg「ニプロ」	アトモキセチン錠10mg「ニプロ」	アトモキセチン錠25mg「ニプロ」	アトモキセチン錠40mg「ニプロ」
有効成分 (1錠中)	5.71mg (5mg)	11.43mg (10mg)	28.57mg (25mg)	45.71mg (40mg)
添加物	部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、その他2成分			
外形				
形状	白色のフィルムコーティング錠			
大きさ	直径	5.1mm	6.6mm	7.6mm
	厚さ	2.8mm	3.3mm	3.1mm
	重量	59mg	115.5mg	130mg
本体表示	アトモ5 キセチン ニプロ	アトモ10 キセチン ニプロ	アトモ25 キセチン ニプロ	アトモ40 キセチン ニプロ

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

アトモキセチン錠 5mg・10mg・25mg・40mg「ニプロ」

体重別投与量早見表 (6歳以上18歳未満の患者)

体重 (kg)	1 段階		2 段階			3 段階 / 維持量下限			維持量上限		
	0.5mg/kg/ 日		0.8mg/kg/ 日			1.2mg/kg/ 日			1.8mg/kg/ 日		
	有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕	有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕		有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕		有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕	
20	10.0		16.0			24.0	10mg 5mg 10mg		36.0		
21	10.5		16.8			25.2		10mg	37.8	10mg	25mg
22	11.0		17.6	5mg	10mg	26.4	5mg	5mg	39.6		
23	11.5		18.4			27.6	10mg	10mg	41.4	5mg 10mg	25mg
24	12.0	5mg	19.2			28.8			43.2		
25	12.5		20.0			30.0		10mg	45.0	10mg	25mg
26	13.0		20.8			31.2		10mg	46.8	10mg	25mg
27	13.5		21.6			32.4	10mg	25mg	48.6		
28	14.0		22.4	10mg	10mg	33.6			50.4		25mg
29	14.5		23.2			34.8		25mg	52.2	25mg	25mg
30	15.0		24.0			36.0			54.0		
31	15.5		24.8			37.2	5mg	25mg	55.8		5mg
32	16.0		25.6			38.4	10mg		57.6	25mg	25mg
33	16.5		26.4			39.6			59.4		25mg
34	17.0		27.2	10mg	5mg	40.8			61.2		10mg
35	17.5	5mg	28.0	10mg	10mg	42.0	10mg	25mg	63.0	25mg	25mg
36	18.0		28.8			43.2	10mg		64.8		
37	18.5		29.6			44.4		5mg 25mg 10mg	66.6	5mg 25mg 10mg	25mg
38	19.0		30.4			45.6			68.4		
39	19.5		31.2			46.8	25mg	25mg	70.2	10mg	10mg
40	20.0		32.0	5mg	5mg	48.0		25mg	72.0	10mg	25mg
41	20.5		32.8	10mg	10mg	49.2			73.8	25mg	25mg
42	21.0		33.6			50.4			75.6		25mg
43	21.5		34.4			51.6		5mg	77.4	25mg	25mg
44	22.0		35.2			52.8	25mg	25mg	79.2	25mg	25mg
45	22.5	10mg	36.0			54.0			81.0		
46	23.0		36.8	10mg	25mg	55.2			82.8	40mg	40mg
47	23.5		37.6			56.4	25mg	10mg	84.6		
48	24.0		38.4			57.6		25mg	86.4	40mg 5mg	40mg
49	24.5		39.2			58.8			88.2	40mg	40mg

体重 (kg)	1 段階		2 段階			3 段階 / 維持量下限			維持量上限		
	0.5mg/kg/ 日		0.8mg/kg/ 日			1.2mg/kg/ 日			1.8mg/kg/ 日		
	有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕	有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕		有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕		有効成分 として (mg/ 日)	錠剤として 朝 夕	
50	25.0		40.0			60.0	25mg 10mg 25mg		90.0		10mg
51	25.5		40.8			61.2			91.8	40mg	40mg
52	26.0		41.6	5mg	25mg	62.4	5mg	10mg	93.6		
53	26.5		42.4	10mg		63.6	25mg	25mg	95.4	5mg	10mg
54	27.0	10mg	43.2			64.8			97.2	40mg	40mg
55	27.5		44.0			66.0			99.0		
56	28.0		44.8			67.2	10mg	10mg	100.8	10mg	10mg
57	28.5		45.6			68.4	25mg	25mg	102.6		40mg
58	29.0		46.4			69.6			104.4	40mg	40mg
59	29.5		47.2	10mg	25mg	70.8			106.2	10mg	5mg 10mg
60	30.0		48.0	10mg		72.0		25mg	108.0		
61	30.5		48.8			73.2	25mg	25mg	109.8	40mg	40mg
62	31.0		49.6			74.4			111.6	10mg	10mg 10mg
63	31.5		50.4			75.6			113.4	40mg	40mg
64	32.0	5mg	51.2	5mg		76.8	40mg	40mg	115.2	10mg	25mg
65	32.5	10mg	52.0		25mg	78.0			117.0		
66	33.0		52.8	25mg	25mg	79.2			118.8	40mg	40mg
67	33.5		53.6			80.4					
68	34.0		54.4			81.6		5mg			
69	34.5		55.2			82.8	40mg	40mg		5mg 10mg 25mg	40mg
70	35.0		56.0		5mg	84.0					
71	35.5		56.8	25mg	25mg	85.2				40mg	40mg
72	36.0		57.6			86.4					
73	36.5		58.4			87.6	40mg	10mg			
74	37.0	10mg	59.2			88.8		40mg			
75	37.5		60.0			90.0				40mg	40mg
76	38.0		60.8		10mg	91.2					
77	38.5		61.6	25mg	25mg	92.4	5mg	10mg			
78	39.0		62.4			93.6	40mg	40mg			
79	39.5		63.2			94.8					

* : 1日あたりの最大用量はアトモキセチンとして120mg