

アスベリン®錠10・20
アスベリン®散10%
アスベリン®ドライシロップ®2%
アスベリン®シロップ®0.5%
アスベリン®シロップ「調剤用」2%



用法・用量 注意喚起カード

●剤形の違いによる処方誤り、調剤誤りにご注意ください。

用法・用量

チペピジンクエン酸塩として、通常成人1日60～120mg (チペピジンヒベンズ酸塩として、66.5～132.9mg)を3回に分割経口投与する。

小児はチペピジンクエン酸塩として、1日1歳未満5～20mg、1歳以上3歳未満10～25mg、3歳以上6歳未満15～40mgを3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

用法・用量に関連する注意

1日量剤形換算

剤形	1歳未満	1歳以上 3歳未満	3歳以上 6歳未満	成人
錠10	—	—	—	6～12錠
錠20	—	—	—	3～6錠
散10%	0.05～0.2g	0.1～0.25g	0.15～0.4g	0.6～1.2g
ドライシロップ 2%	0.25～1g	0.5～1.25g	0.75～2g	3～6g
シロップ 0.5%	1～4mL	2～5mL	3～8mL	12～24mL
シロップ 「調剤用」2%	0.25～1mL	0.5～1.25mL	0.75～2mL	3～6mL

■「効能・効果」、「禁忌」を含む注意事項等情報等については、最新の電子添文をご参照ください。

ニフ。株式会社

2025年5月作成 (ATR) [審2505120664]