

NIPRO  
NIPRO  
NIPRO  
NIPRO  
NIPRO  
NIPRO  
NIPRO  
NIPRO

▲ 開封口

# アトモキセチン 内用液 0.4%「ニプロ」

小分けセット

注意

アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」  
以外に使用しないでください。

空瓶・非売品



アトモキセチン  
内用液0.4%「ニプロ」

小分けセット


性状	
有効成分	アトモキセチン
添付文書	あり
ピストン	あり
カップ	あり
ビベット	あり
アダプター	あり
プラスチックキャップ	あり
ガラス瓶	あり
本剤	あり

2024.12  
1.9025

## アトモキセチン内用液 0.4%「ニプロ」の使用方法

ご使用の際はこの使用説明書に従って服用してください。

### 製品内容



- 注1) お子さまの誤飲を防ぐため、お子さまには開けにくい安全キャップを採用しています。
- 注2) 本剤は無色透明な液体です(1mL中アトモキセチン(有効成分)4mgを含有)。ここではわかりやすいように **灰色** で示しています。

### 注意事項

- お子さまが服用する場合は必ず保護者が服用させてください。
- お子さまの手の届かないところに保管してください。
- お子さまが誤ってアダプターを飲み込まないように注意してください。
- 手などについたらすぐに水で洗ってください。
- この薬の成分は、目への刺激性があります。目に入った場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
- 直射日光を避け、室温で、ボトルをたてて保管してください。
- 使用中、薬液に異常が見られた場合は、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 開封後45日を経過した製品は服用しないでください。
- 薬剤師などの医療関係者から使用期限について指示があった場合は、その指示を守ってください。

### アトモキセチン内用液0.4%を小分けして交付される場合のお願い

アトモキセチン内用液0.4%は、正しく安全に服用していただくために特設な容器仕様を採用しております。原則、希釈済みのままでの交付をお願いしておりますが、やむを得ず小分けして交付される場合には、本小分けセット<sup>®</sup>をご使用ください。

使用期限シール

アトモキセチン内用液0.4%使用期限

年 月 日

- 小分けする場合は使用期限は製品開封日及び薬剤交付日より異なります。「製品開封後90日」、「薬剤交付後45日」のうちいずれか早い方が小分けした製品の使用期限です。使用期限を患者さんにお伝えするとともに、本使用期限シールに記入して小分け瓶に貼付してください。

※小分けセット: 小分け瓶、アダプター、ビベット、カップ、使用説明書、本使用期限シール

以下の点についても十分にご注意ください。

- ① 小分け瓶と同梱されている附属品(アダプター、ビベット、カップ)と使用説明書を併せて交付してください。
- ② 使用説明書に記し、患者さん及び保護者の方に服用方法を指導してください。
- ③ アトモキセチン内用液0.4%は希釈せず交付してください。
- ④ 一度小分けした薬液は製品容器に戻さないでください。
- ⑤ 小分けして交付する際には製品容器は使用しないでください。
- ⑥ 小分けする際には異物の混入や微生物による汚染が起きないように注意してください。
- ⑦ 眼刺激性があるため、手に付いたり、目に入った場合はすぐに水で洗ってください。
- ⑧ 本小分けセットをアトモキセチン内用液0.4%の小分け以外の用途に使用しないでください。
- ⑨ 外箱に記載されている使用期限を過ぎた場合は、本小分けセットを使用せず廃棄してください。

