

ドネペジル塩酸塩OD錠「ニプロ」

～服用にあたって注意いただくこと～

3mg



(実物大)

5mg





(実物大)

10mg



(実物大)



- 1 日 1 回お飲みください。
- お薬の量は主治医の指示に従ってください。
1 日 3mg (黄色の錠剤) から開始し、1～2 週間後に
1 日 5mg (白色の錠剤) になります。
(お薬の量を少しから始めるのは、お薬に体を徐々に慣れさせていくためです)
その後、症状の進行に合わせて 1 日 10mg (ピンク色の錠剤)
になります。
- 飲み忘れても 2 日分を一度に飲まないでください。
- お薬の服用を、**ご自身やご家族の判断で中止しない**でください。
- お薬はシートから取り出してお飲みください。
- 1 回分ずつお薬がまとめられている場合があります。

このお薬を飲まれる方へ

舌の上に乗せて唾液を含ませると、水なしで飲むことができます。また、水で飲むこともできます。ただし、寝たままの状態では、水なしで服用しないでください。

服薬チェックシート

薬の飲み忘れがないかをチェックするためのものです。服用後、1枚ずつカレンダーに貼ってお使いください。

※チェックシートをご希望の場合は、医療機関へお問い合わせください。



気になることやわからないことがある場合は、
医師または薬剤師に相談してください。

医療機関名

製品に関するお問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室

0120-226-898 受付時間 9:00~17:15
(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)

患者さん向け資材等の
取り寄せサイト(医療関係者向け)はこちら▶▶
<https://order.nipro.co.jp/items>

