「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報 等の詳細は、電子添文をご参照ください。

本剤を溶解時、微細な泡がみられます。泡立ちにご注意ください。

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」溶解方法

1 バイアルのキャップをはずし、針をバイアルのゴム栓中央部に**まっすぐに刺す**。



2 **生理食塩液**または**注射用水7mL**をバイアルの**内壁をつたわらせながらゆっくり**と注入する。(薬剤全体を湿らせる。)



3 **なるべく泡立たないように**数分間ゆっくりとバイアルを回す。

4 溶解液中の微細な泡が落ち着いた後、**完全に溶解したことを確認**する。



溶解方法動画

5 針をバイアルのゴム栓中央部にまっすぐ刺し、溶解した液を**なるべく泡立たないようにゆっくり**とシリンジで抜き取る。

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」成人における投与量体重別換算表

敗血症、感染性心内膜炎

成人18歳以上／用量6mg/kg／30分点滴静注／静脈内注射

体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*
30	3.6	70	8.4
35	4.2	75	9.0
40	4.8	80	9.6
45	5.4	85	10.2
50	6.0	90	10.8
55	6.6	95	11.4
60	7.2	100	12.0
65	7.8		

深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染

成人18歳以上／用量4mg/kg／30分点滴静注／静脈内注射

体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*
30	2.4	70	5.6
35	2.8	75	6.0
40	3.2	80	6.4
45	3.6	85	6.8
50	4.0	90	7.2
55	4.4	95	7.6
60	4.8	100	8.0
65	5.2		

*バイアルより抜き取り量

【6. 用法及び用量】(成人)

敗血症、感染性心内膜炎

通常、成人にはダプトマイシンとして1日1回6mg/kgを24時間ごとに30分かけて点滴静注又は緩徐に静脈内注射する。

深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染

通常、成人にはダプトマイシンとして1日1回4mg/kgを24時間ごとに30分かけて点滴静注又は緩徐に静脈内注射する。

ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」小児における投与量体重別換算表

敗血症					
1歳以上7歳未満		7歳以上12歳未満		12歳以上18歳未満	
用量 12 mg/kg		用量 9 mg/kg		用量 7 mg/kg	
60分点滴静注		30分点滴静注		30分点滴静注	
体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*
5	1.2	16	2.9	32	4.5
6	1.4	18	3.2	34	4.8
7	1.7	20	3.6	36	5.0
8	1.9	22	4.0	38	5.3
9	2.2	24	4.3	40	5.6
10	2.4	26	4.7	42	5.9
11	2.6	28	5.0	44	6.2
12	2.9	30	5.4	46	6.4
13	3.1	32	5.8	48	6.7
14	3.4	34	6.1	50	7.0
15	3.6	36	6.5	52	7.3
16	3.8	38	6.8	54	7.6
17	4.1	40	7.2	56	7.8
18	4.3	42	7.6	58	8.1
19	4.6	44	7.9	60	8.4
20	4.8	46	8.3	62	8.7
21	5.0	48	8.6	64	9.0
22	5.3	50	9.0	66	9.2
23	5.5	52	9.4	68	9.5
24	5.8	54	9.7	70	9.8
25	6.0	56	10.1	72	10.1
26	6.2	58	10.4	74	10.4
27	6.5	60	10.8	76	10.6
28	6.7	62	11.2	78	10.9
29	7.0				
30	7.2				

深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染							
1歳以上2歳未満		2歳以上7歳未満		7歳以上12歳未満		12歳以上18歳未満	
用量 10 mg/kg		用量 9 mg/kg		用量 7 mg/kg		用量 5 mg/kg	
60分点滴静注		60分点滴静注		30分点滴静注		30分点滴静注	
体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*	体重(kg)	必要溶液量(mL)*
5	1.0	4	0.7	16	2.2	32	3.2
6	1.2	6	1.1	18	2.5	34	3.4
7	1.4	8	1.4	20	2.8	36	3.6
8	1.6	10	1.8	22	3.1	38	3.8
9	1.8	12	2.2	24	3.4	40	4.0
10	2.0	14	2.5	26	3.6	42	4.2
11	2.2	16	2.9	28	3.9	44	4.4
12	2.4	18	3.2	30	4.2	46	4.6
13	2.6	20	3.6	32	4.5	48	4.8
14	2.8	22	4.0	34	4.8	50	5.0
15	3.0	24	4.3	36	5.0	52	5.2
		26	4.7	38	5.3	54	5.4
		28	5.0	40	5.6	56	5.6
		30	5.4	42	5.9	58	5.8
		32	5.8	44	6.2	60	6.0
		34	6.1	46	6.4	62	6.2
		36	6.5	48	6.7	64	6.4
		38	6.8	50	7.0	66	6.6
		40	7.2	52	7.3	68	6.8
		42	7.6	54	7.6	70	7.0
				56	7.8	72	7.2
				58	8.1	74	7.4
				60	8.4	76	7.6
				62	8.7	78	7.8

*バイアルより抜き取り量

【6.用法及び用量】(小児)

敗血症

通常、ダプトマイシンとして以下の用法及び用量に従い投与する。

年齢	用法及び用量
12歳以上18歳未満	1日1回7mg/kgを24時間ごとに30分かけて点滴静注
7歳以上12歳未満	1日1回9mg/kgを24時間ごとに30分かけて点滴静注
1歳以上7歳未満	1日1回12mg/kgを24時間ごとに60分かけて点滴静注

深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染

通常、ダプトマイシンとして以下の用法及び用量に従い投与する。

年齢	用法及び用量
12歳以上18歳未満	1日1回5mg/kgを24時間ごとに30分かけて点滴静注
7歳以上12歳未満	1日1回7mg/kgを24時間ごとに30分かけて点滴静注
2歳以上7歳未満	1日1回9mg/kgを24時間ごとに60分かけて点滴静注
1歳以上2歳未満	1日1回10mg/kgを24時間ごとに60分かけて点滴静注

NIPRO
製造販売元
(資料請求先)
ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号
https://www.nipro.co.jp/

2026年11月作成(TT)
[審2611065524]