



デュロキセチンカプセル・OD錠「ニプロ」

患者さん向け服薬指導箋

- ☐ 糖尿病性神経障害に伴う疼痛
- ☐ 線維筋痛症に伴う疼痛
- ☐ 慢性腰痛症に伴う疼痛
- ☐ 変形性関節症に伴う疼痛

デュロキセチンカプセル・OD錠「ニプロ」 を服用される患者さんにご家族の方へ

デュロキセチン「ニプロ」には、飲み薬として一般的なカプセル剤と口の中で崩壊し水なしでも服用できる口腔内崩壊錠(OD錠)の2つの剤形があります。

カプセル20mg「ニプロ」 カプセル30mg「ニプロ」



OD錠20mg「ニプロ」 OD錠30mg「ニプロ」



錠剤(実物大)、PTPシート(50%縮小)

- 医師から指示された服用量を守ってください。
- 医師の指示なしに、服用をやめないでください。
- カプセル剤は、カプセルをあけたりせず、コップ1杯程度の水またはぬるま湯でそのまま飲んでください。
- OD錠は口の中で崩壊しますが、その後は唾液またはコップ一杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。ただし、寝たままの状態では水またはぬるま湯なしで飲まないでください。
- カプセル剤、OD錠ともに腸溶性コーティングを施していますので、すりつぶしたり、かみ砕かずに服用してください。



- 飲み忘れに気がついたときは、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばして、翌日に1回分を飲んでください。**決して2回分を一度に飲まないでください。**
- 眠気やめまいなど、自動車の運転に影響を与える症状があらわれることがありますので、注意してください。これらの体調不良を自覚した場合は、絶対に運転しないでください。
- このお薬を服用中は、飲酒を控えてください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方は医師に相談してください。
- ご高齢の方は、めまいなどにより転倒することがありますので、注意してください。
- お薬は直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 気になることがありましたら、医師または薬剤師に相談してください。



医療機関名